



Vištų kiaušinių inkubavimo režimas "RoboCipa V1.0, V1.1, V1.2"

Diena	T (oro)	T (kiaušinio)	Oro drėgmė %	Vartymas	Aušinimas
1	38.0	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
2	38.0	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
3	37.8	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
4	37.8	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
5	37.8	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
6	37.8	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
7	37.8	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
8	37.8	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
9	37.8	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
10	37.8	-	50	Ijungtas. Kas 2val.	-
11	37.8	38.0	50	Ijungtas. Kas 2val.	1 kartus per dieną 10 min.
12	37.8	38.0	50	Ijungtas. Kas 2val.	1 kartus per dieną 10 min.
13	37.8	38.0	50	Ijungtas. Kas 2val.	1 kartus per dieną 10 min.
14	37.6	38.0	50	Ijungtas. Kas 2val.	1 kartus per dieną 10 min.
15	37.6	38.3	50	Ijungtas. Kas 2val.	1 kartus per dieną 10 min.
16	37.6	38.3	50	Ijungtas. Kas 2val.	1 kartus per dieną 10 min.
17	37.6	38.3	50	Ijungtas. Kas 2val.	1 kartus per dieną 10 min.
18	37.4	38.3	60	Ijungtas. Kas 2val.	1 kartus per dieną 10 min.
19	37.4	38.3	70-75	-	
20	37.4	38.3	70-75	-	
21	37.4	38.3	70-75	-	

Atmintinė ūkininkui inkubacijos metu:

*Nuo inkubacijos vidurio kiaušinis pradeda skleisti daug šilumos bei CO₂, ir jūs turite būti tam pasiruošę! Pradėkite aktyviai vėdinti ir aušinti inkubatorių. Tai galima padaryti įdėjus ventiliatorių į inkubatorių su valdiklio pagalba, arba rankiniu būdu. Geriausias variantas: ventiliatorius su valdikliu reguliariai vėdina (gaivina orą), o rankiniu būdu aušinate atidarant inkubatoriaus dangtį 10-20 minučių.

*Kiaušinių perkaitimas yra blogesnis nei nedašildymas, dėl to kyla rimtesnių problemų ir didesnis procentalus embrionų/viščiukų mirtingumas. Perkaitinimas - kiaušinio temperatūra virš 39C – yra kritinė!

*Kontroliuoti temperatūrą reikia ant kiaušinio, tai svarbiausia! Tai daryti galima pirometru, arba nedideliu elektroninio termometro jutikliu priklijuotu prie kiaušinio su lipnia juosta.

*Kiaušinių perkaitimas gali įvykti bet kurioje temperatūroje ir prie 37,7 ir prie 36,7 – tai labai individualu. Tačiau svarbiausias faktorius: tankumas (didelis kiaušinių kiekis nedideliame inkubatoriuje), padėti gali papildomas vėdinimo ventiliatorius.