

InToJon

Žąsų kiaušinių inkubavimo režimas "RoboCipa" inkubatoriuose

Diena	T (oro)	Oro drėgmė %	Vėdinimas	Aušinimas + Purškimas vandeniu (kartai per dieną)	Automatinis vartymas	Data
1	38.0	55	kas 60min.	-	įjungtas	
2	38.0	55	kas 60min.	-	įjungtas	
3	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas	
4	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas	
5	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas	
6	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas	
7	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas	
8	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas	
9	37.8	55	kas 60min.	-	įjungtas	
10	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
11	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
12	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
13	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
14	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
15	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
16	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
17	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
18	37.8	60	kas 60min.	2x - 10min	įjungtas	
19	37.6	60	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
20	37.6	60	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
21	37.6	60	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
22	37.6	60	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
23	37.6	65	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
24	37.4	65	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
25	37.4	65	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
26	37.4	65	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
27	37.4	65	kas 30min.	2x - 10min	įjungtas	
28	37.4	70	kas 15min.	2x - 10min	įjungtas	
29	36.8-37.4	70	kas 15min.	2x - 10min	išjungtas	
30	36.8-37.4	75-82	kas 15min.	2x - 10min	išjungtas	
31	36.8-37.4	75-82	kas 15min.	2x - 10min	išjungtas	
32						

Atmintinė ūkininkui inkubacijos metu:

Dieną prieš pakeliant drėgmę, reikia išjungti vartymą, pastatyti krepšius į horizontalią padėtį ir uždėti dangčius.

*Kiaušinių perkaitimas yra blogesnis nei nedašildymas, dėl to kyla rimtesnių problemų ir didesnis procentus embrionų/vi
mirtingumas. Perkaitinimas - kiaušinio lukšto temperatūra virš 39C – yra kritinė! Rekomenduojama kiaušinio lukšto tempe
38.3 - 38.5C

*Kiaušinio lukšto temperatūra

reikia pradėti matuoti ir stebėti antroje perinimo ciklo pusėje.

*Kontroliuoti temperatūrą reikia ant kiaušinio, tai svarbiausia! Tai daryti galima piometru, arba nedideliu elektroninio
termometro jutikliu priklijuotu prie kiaušinio su lipnia juosta.

*Kiaušinių perkaitimas gali įvykti bet kurioje inkubatoriaus temperatūroje ir prie 37,7C ir prie 36,7C – tai labai individualu.

Naują instrukcijos lapą galite atsisiųsti svetainėje www.intojon.lt skiltyje "Instrukcijos"